Дефендер

дәрілеу

MANAI AGRO

Әсер етуші заттар: тиаметоксам, 375 г/л + протиоконазол, 60 г/л + азоксистробин, 60 г/л

Препаративтік түрі: суспензия концентраты

Тіркеуші: ТОО "Terra Prime"

Өндіруші: AGROBEATS TECH CO., LTD, China

Қауіптілік санаты: III (дұрыс қолданылған жағдайда өнім қауіпсіз)

Әсер ету ауқымы: Айқын физиологиялық әсері бар, дәнді масақты дақылдардың тұқымын дәрілеуге арналған кешенді инсектицидтік-фунгицидтік дәрілеуіш. Тұқымдық және топырақтық инфекциялардан қорғауды, сондай-ақ топырақта тіршілік ететін және жер үсті зиянкестерін бақылауды қамтамасыз етеді.

Сақтау мерзімі: 3 жыл.

Қолдану технологиясы және сақтық шаралары: Жұмыс ерітіндісін тікелей қолданар алдында дайындап, сол күні пайдалану қажет. Бүріккіш бағын 1/2 көлеміне дейін сумен толтырып, препараттың толық нормасын қосып, араластырғышпен араластырып, қалған суды қосу керек. Барлығын мұқият араластыру қажет. Бүрку барысында ерітіндіні бүріккіштің гидроараластырғышымен үздіксіз араластырып отыру керек.

Құю және өңдеу жұмыстарын қорғаныш киімімен, резеңке қолғаппен, көзілдірікпен және респиратормен жүргізу қажет. Жұмыс кезінде темекі шегуге және тамақ ішуге тыйым салынады!

Пестицидпен және пайдаланылған ыдыстармен құдықтарды, өзендерді және басқа су нысандарын ластауға жол берілмейді. Жабдықтарды ағып кету ықтималдығына қарсы тексеру қажет.

Сақтау шарттары: Пестицидтерді сақтауға арнайы арналған қоймаларда, түпнұсқалық, ашылмаған қаптамада немесе контейнерлерде сақтау керек. Сақтау температурасы: –5 °С-тан +40 °С-қа дейін.

Тасымалдау кезіндегі қауіпсіздік шаралары: Препаратты қауіпті жүктерді тасымалдау ережелеріне сәйкес, жабық көлік құралдарында көліктің барлық түрімен тасымалдауға болады.

Дақыл	Арамшөптер	Препаратты қолдану мөлшері л/га	Қолдану тәсілі, уақыты
Жаздық бидай Жаздық арпа	Өсімді ынталандырушы, бүргелер, астық шыбындары, бізтұмсықтар, топырақ зиянкестері (сымқұрттар, жалған сымқұрттар); қатты, тозаңды және қара күйе; тамыр шіріктері; тұқымның көгеруі; септориоз	0,4-0,5	Тұқымды себер алдында немесе алдын ала (1 жылға дейін) дәрілеу. Сұйықтық шығыны – 8–10 л/т

Көлемі: 5 л