Скельта

гербицид

MANAI AGRO

Действующее вещество: Клетодим, 125 г/л.

Препаративная форма: Концентрат эмульсии (К.Э)

Регистрант: ТОО "Terra Prime"

Производитель: NANJING BIOAGRILAND CROP CARE CO., LTD

Класс опасности: III (продукт не представляет опасности при правильном использовании).

Технология применения: Обработку проводить в утренние и вечерние часы. Не проводить обработку посевов в периоды, когда листья культурных растений и сорняков увлажнены или в течение часа после обработки ожидается дождь (во избежания смыва препарата). Сроки обработки не зависят от стадии развития культуры, однако культурные растения не должны закрывать собой сорняки, препятствуя их равномерному опрыскиванию. Норма расхода рабочей жидкости должна быть достаточной для полного и равномерного покрытия сорняков препаратом.

Скорость воздействия: Препарат быстро проникает в листья сорных растений (в течение часа). По сосудистой системе перемещается ко всем органам, включая корни и корневища, вызывая поражения точек роста у сорняков. Полное отмирание сорных растений наступает через 10-15 дней после обработки. При борьбе с многолетними злаковыми сорняками следует исключить культивацию междурядий в течение 15 дней после обработки для достижения максимального эффекта препарата. При необходимости можно применять в баковых смесях с рекомендуемыми для каждой культуры препаратами против двудольных сорняков и с инсектицидами. Всегда перед применением проверить физическую совместимость препаратов.

Срок годности: Не менее 3 лет в оригинальной фабричной упаковке (при соблюдении условий хранения)

Фитотоксичность, толерантность культур: Фитотоксичен для злаковых культурных растений. К гербициду устойчивы широколистные растения. При соблюдении регламентов применения фитотоксичности для двудольных культур не наблюдается.

Первая помощь при отравлении:

- при первых признаках отравления – обеспечить пострадавшему доступ свежего воздуха, при необходимости сделать искусственное дыхание, освободить от загрязненной одежды. при случайном попадании в рот – не вызывать рвоту,
- прополоскать рот водой, дать выпить активированный уголь в нескольких стаканах воды из расчета 1 г сорбента на 1 кг массы тела. при попадании препарата в глаза – немедленно
- промыть их большим количеством проточной воды в течение 15 минут при открытых веках. при контакте с кожей – промыть загрязненные
- участки водой с мылом. Во всех случаях отравления препаратом после оказания первой помощи пострадавшему необходимо обратиться к врачу.

Лечение симптоматическое. Специфических антидотов нет.

Способы обезвреживания, утилизации тары и остатков пестицида: Обезвреживание и утилизацию тары, остатков препарата и промывных вод необходимо проводить в соответствии с СанПиН 1.2.2584-10 (Москва, 2002 г) Не допускается загрязнение водоемов хозяйственнобытового и рыбохозяйственного назначения непосредственно препаратом или использованной тарой. Запрещается сливать препарат в канализацию, а также в любые водоемы!

Условия хранения: в специально предназначенных для пестицидов складских помещениях, в герметично закрытой, без повреждений заводской упаковке при температуре хранения от минус 10°С до плюс 40°С. Хранение препарата совместно с пищевыми продуктами и комбикормами категорически запрещается!

Меры безопасности при работе, транспортировке и хранении: При работе необходимо соблюдать требования и меры предосторожности согласно ГОСТ 12.3.041-86:

- при наземной обработке растений пестицидом санитарно-защитная зона должна быть не менее 300 м; опрыскивание растений с использованием
- штанговых тракторных опрыскивателей проводится при скорости ветра не более 4 м/с (мелкокапельное) и 5 м/с (крупнокапельное);

Запрещаются работы с препаратом без средств индивидуальной защиты органов дыхания, зрения и кожных покровов.

Транспортировка препарата осуществляется только в заводской упаковке с заводской этикеткой всеми видами транспортных средств в соответствии с правилами перевозки опасных грузов, действующими на данном виде транспорта.

Культура, обрабатываемый объект	Сорные растения	Норма расхода препарата, л/га	Способ, время обработки
Подсолнечник	Однолетние и многолетние злаковые сорняки в том числе пырей ползучий	0,5-2,0	Опрыскивание посевов в фазу 2-6 листьев у однолетних сорняков и высоте пырея 10-20 см независимо от фазы развития культуры
Лен			
Чечевица			
Горох			

Объем: 20 л